

Impfkalender für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

Patientenalter* Impfung gegen	2. Lebensmonat	3. Lebensmonat	4. Lebensmonat	11-14 Lebensmonat	15-23 Lebensmonat	5-6 Jahre	9-17 Jahre	Ab 18 Jahre			
Wundstarrkrampf (Tetanus)	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung		1. Auffrischung	2. Auffrischung	Auffrischung alle 10 Jahre			
Diphtherie											
Keuchhusten (Pertussis)											
Kinderlähmung (Poliomyelitis)											
Haemophilus influenzae Typ b											
Hepatitis B											
Pneumokokken	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung							
Masern, Mumps, Röteln				1. / 2. Impfung							
Windpocken (Varizellen)							1. / 2. Impfung				
Meningokokken				1. Impfung							

Fünffach- oder Sechsfachimpfstoff (Zwischen 1.+2.+3. Impfung jeweils Mindestabstand 4 Wochen. Bei Fünffachimpfstoff Hepatitis B zu einem späteren Zeitpunkt)

Einfachimpfstoff (Kann zusammen mit Fünffach- bzw. Sechsfachimpfstoff geimpft werden)

Vierfachimpfstoff (Mindestabstand zu anderen Impfungen 4 Wochen)

Einfachimpfstoff (Impfung von Jugendlichen ohne Windpockenerkrankung oder –Impfung. Mindestabstand 4 Wochen)

Einfachimpfstoff (Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat)

Zweifach-/ Dreifachimpfstoff (Mindestabstand zur letzten Tetanusimpfung ⇒ 5 Jahre)

Vierfachimpfstoff (Mindestabstand zur letzten Tetanusimpfung ⇒ 5 Jahre)

- Um die Zahl der Injektionen möglichst gering zu halten, sollten vorzugsweise Kombinationsimpfstoffe verwendet werden.
- Über zusätzliche Impfungen gegen FSME (Zecken), Influenza (Grippe), Hepatitis A, Rotaviren, HPV-Impfung (ab 12 Jahren) oder Reiseimpfungen (z.B. Gelbfieber etc.) beraten wir Sie gerne.

* Alter in vollendeten Monaten bzw. Jahren